

Tabla 13.6. Guía de administración de formas farmacéuticas orales por sonda nasointestinal.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
ACENOCUMAROL (P)	SINTROM® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Riesgo proceso reproductivo, seguir normas de precaución
ACETAZOLAMIDA	EDEMOX® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
ACETILSALICÍLICO ÁCIDO	ADIRO® comp Recubiertos	NO	No triturar para no alterar el recubrimiento		Aspirina® Comp o sobres, Tromalyt® Cap
	ASPIRINA® comp	Ambas	Desleir en 15 - 20 ml de agua	SI	
	TROMALYT® Cap	Ambas	Abrir, y sin triturar los microgránulos, dispersar en 10 - 20 ml de agua o zumo	SI	No deben triturarse los microgránulos, son de liberación retardada
ALPRAZOLAM	ALPRAZOLAM comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Es posible la administración vía sublingual
AMILASA/LIPASA/PROTEASA	KREON® capgastrorresistentes	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de bicarbonato sódico 1M	SI	No triturar los microgránulos, ya que presentan cubierta entérica. Puede obstruir la sonda.
AMIODARONA	AMIODARONA® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Fotosensible, preparar justo antes de administrar. Administrar con alimentos para aumentar la tolerancia gastrointestinal.
AMITRIPTILINA	TRYPTIZOL® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	DEPRELIO® caps	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
AMLODIPINO	AMLODIPINO® comp EFG	Ambas	Desleir en 15 - 20 ml de agua	SI	
AMOXICILINA	AMOXICILINA® caps EFG	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	AMOXICILINA® sobres EFG	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	
	AMOXICILINA® sol OR EFG	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	
AMOXICILINA / CLAVULÁNICO	AMOXICILINA / CLAVULÁNICO® comp EFG	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	AMOXICILINA / CLAVULÁNICO® sobres EFG	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	
	AMOXICILINA / CLAVULANICO® sol OR EFG	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	
ATENOLOL	ATENOLOL® comp EFG	Ambas	Pulverizar y dispersar en 10 mL de agua	SI	Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad. Administrar preferiblemente en ayunas.
ATORVASTATINA	ATORVASTATINA® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	
AZATIOPRINA (P)	IMUREL® comp Recubiertos	Ambas	Utilizar únicamente la FM	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
AZITROMICINA	AZITROMICINA® comp recubiertos EFG	Ambas	Desleír en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	ZITROMAX® caps	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	AZITROMICINA® susp OR EFG	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
BACLOFENO	LIORESAL® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye su gastrolesividad.
BICARBONATO SÓDICO	BICARBONATO SÓDICO NM® sobres	VNG	Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente	NO	Es importante que se realice la disolución completa del polvo previa a la administración. Administrar al menos 1h después de la NE.
BIPERIDENO	AKINETON® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal. Las formas retardadas deben sustituirse con ajuste posológico
BISOPROLOL	BISOPROLOL® comp recubiertos EFG	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua y administrar inmediatamente	SI	Administrar preferiblemente por las mañanas antes de la NE
BROMAZEPAM	BROMAZEPAM® caps EFG	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml de agua	SI	
CALCIO CARBONATO	MASTICAL® comp dispersables	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua y administrar inmediatamente	NO	Administrar al menos 1h después de la NE.
CALCITRIOL	ROCATROL® caps blandas	NO		NO	Riesgo alto de obstrucción de la sonda. Valorar administración por otra vía (parenteral)
CAPTOPRIL	CAPTOPRIL® EFG comp	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua y administrar inmediatamente	SI	Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad. Administrar preferiblemente en ayunas.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
CARBAMAZEPINA (P)	CARBAMAZEPINA® comp EFG	Ambas	Dispensar en 20 ml de solución hidroalcohólica para favorecer solubilidad	SI	Evitar sondas de PVC por adsorción. Administrar en ayunas. Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Utilizar la FM como elección
CARBIMAZOL	NEO-TOMIZOL® comp	Ambas	Desleir en 10 ml de agua	SI	Puede tardar 10 minutos en disolverse.
CARVEDILOL	CARVEDILOL® comp EFG	Ambas	Pulverizar y dispersar preferiblemente en medio ácido	SI	Administrar preferiblemente junto con la NE.
CEFIXIMA	DENVAR® caps	VNG	Abrir y diluir en 20 ml de agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE, por su pH ácido.
	DENVAR® susp OR	VNG		NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE, por su pH ácido.
CEFUROXIMA-AXETILO	ZINNAT® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	La trituración de los comprimidos disminuye la disponibilidad.
	ZINNAT® sobres	Ambas	Disolver en 50 ml agua y administrar inmediatamente	SI	Administrar con alimentos para mejorar la biodisponibilidad.
	ZINNAT® sol OR	Ambas	Diluir en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	La alternativa preferente. Administrar con alimentos para mejorar la biodisponibilidad.
CICLOFOSFAMIDA (P)	GENOXAL® comp recubiertos	Ambas	Dispensar en 20 ml de agua	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Preferiblemente no manipular el comprimido. Utilizar la FM.
CICLOSPORINA (P)	SANDIMMUN® cap				Cambiar a ciclosporina sol OR

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
	SANDIMMUN® sol OR	VNG	Diluir en 50 ml de agua y administrar inmediatamente	SI	Administrar con alimentos para mejorar la biodisponibilidad. No administrar por sondas de PVC, podría adherirse a la sonda.
CIPROFLOXACINO	CIPROFLOXACINO® comp recubierto EFG	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua	SI	Preferiblemente separar de la NE, especialmente de lácteos (al menos 2h).
	CETRAXAL® susp OR	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	Preferiblemente separar de la NE, especialmente de lácteos (al menos 2h).
CITALOPRAM	CITALOPRAM® comp recubierto EFG	Ambas	Dispensar en 10 ml de agua	SI	
CLINDAMICINA	CLINDAMICINA® caps EFG	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
CLOMETIAZOL	DISTRANEURINE® caps blandas	NO	Al extraer el contenido de la cápsula con una jeringa el líquido es muy denso y puede obstruir la sonda.	NO	Valorar sustitución por un equivalente terapéutico.
CLONAZEPAM (P)	CLONAZEPAM® comp EFG	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	Valorar sustituir por clonazepam gotas OR
	RIVOTRIL® gotas	Ambas	Diluir en 10 ml agua	SI	Riesgo proceso reproductivo, seguir normas de precaución
CLONIDINA	CATAPRESAN® comp	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua	SI	
CLOPIDOGREL	CLOPIDOGREL® comp recubiertos EFG	Ambas	Dispensar en 10 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
CLORAMBUCILO (P)	CLORAMBUCILO® comp recubiertos EFG	Ambas	Desleír en 10-20 ml de agua	SI	Seguir normas de precaución. Administrar preferiblemente en ayunas.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
CLORAZEPATO DIPOTÁSICO	CLORAZEPATO® caps EFG	VG de elección	Desleir en 10 ml de agua	SI	No se recomienda la administración post-pilórica por escasa absorción.
CLORPROMAZINA	LARGACTIL® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	Preferiblemente sustituir por las presentaciones en gotas OR o ampollas según la vía de administración. Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	LARGACTIL® gotas OR	VG de elección	Diluir en 10 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	LARGACTIL® ampollas	VPP de elección	Administrar directamente sin diluir	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
CLORTALIDONA	HIGROTONA® comp	Ambas	Triturar y dispersar en 10 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
CLOXACILINA	ORBENIN® caps y ANACLOSIL® caps	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml de agua	NO	Administrar en ayunas
COLCHICINA	COLCHICINA SEID® comp	VG. No hay suficiente información sobre la VPP	Desleír en 10-20 ml de agua. No pulverizar		Riesgo proceso reproductivo, seguir normas de precaución
COLESTIRAMINA	EFENSOL® sobre, RESINCOLESTIRAMINA® sobre	Ambas	Diluir en 150 ml de agua o zumo.	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE. Administrar separadamente de otros medicamentos para evitar que interfiera en su absorción. Puede obstruir la sonda.
DABIGATRAN	PRADAXA® caps	NO		NO	No se recomienda abrir la cápsula ya que aumenta la biodisponibilidad del principio activo.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
DEFLAZACORT	ZAMENE® comp, DEZACOR® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
	DEZACOR® gotas OR	Ambas	Diluir en 10 ml de agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
DEXKETOPROFENO	ENANTYUM® comprec	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Es compatible con la NE, pero la presencia de alimentos puede retrasar la absorción. La administración con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
DEXAMETASONA	DEXAMETASONA® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	La presentación iny. puede ser administrada por vía OR.
DEXCLORFENIRAMINA	POLARAMINE® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Administrar en ayunas. De elección el uso de la solución OR o administrar la ampolla por vía OR.
	POLARAMINE® sol OR	Ambas	Disolver en 10 ml de agua	SI	
DIAZEPAM	DIAZEPAM® comp EFG	Ambas	Desleir en 10-20 ml de agua	SI	Con alimentos mejora la biodisponibilidad.
	DIAZEPAM® gotas OR	Ambas	Administrar directamente sin diluir	SI	Se recomienda evitar sondas de PVP. Administrar directamente, al diluirse aumenta la biodisponibilidad.
DIGOXINA	DIGOXINA KERN® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI (NO compatible si NE con fibra)	Preferiblemente utilizar la suspensión OR, ya que puede alterarse la farmacocinética del comprimido.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
DILTIAZEM	DILTIAZEM® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Utilizar como alternativa a las formas retardadas con ajuste posológico
	DILTIAZEM RETARD® caps de lib prolongada	Ambas	Abrir y dispersar en 10 ml de agua	SI	No deben triturarse los microgránulos, son de liberación retardada
DOMPERIDONA	DOMPERIDONA® comp recubiertos EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 15 minutos antes de la NE
	DOMPERIDONA GAMIR® caps	Ambas	Abrir y dispersar en 10 ml de agua	NO	Administrar 15 minutos antes de la NE
	MOTILIUM® Susp OR	Ambas	Administrar directamente sin diluir	NO	Administrar 15 minutos antes de la NE
DONEPEZILO	DONEPEZILO® comp recubiertos	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
	ARICEPT® FLAS compbucodispersables	Ambas	Desleir en 10-20 ml de agua	SI	Si el paciente lo tolera, administrar de forma bucodispersable
DOXAZOSINA	DOXAZOSINA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15 - 20 ml de agua	SI	
	DOXAZOSINA® comp de liberación retardada EFG				Se recomienda valorar intercambio a la presentación de liberación inmediata, ajustando la posología.
DOXICICLINA	DOXICICLINA® cap EFG	Ambas	Abrir y dispersar en 10 ml de agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	VIBRACINA ® sol OR	Ambas		NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
ENALAPRIL	ENALAPRIL® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
ESPIRONOLACTONA (P)	ESPIRONOLACTONA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Si hay posibilidad, solicitar la FM.
ETAMBUTOL	MYAMBUTOL® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
FAMOTIDINA	FAMOTIDINA® comp recubiertos EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
FENITOINA (P)	SINERGINA® comp				Preferiblemente administrar la solución OR
	EPANUTIN® caps		Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua		Preferiblemente administrar la solución OR
	EPANUTIN® Sol OR (M. Extranjero)	Ambas	Diluir en 25 -30 ml de agua	NO	Seguir normas precaución peligrosos. Administrar 2h antes o 2h después de la NE. Lavar la sonda con 30 ml de agua tras la administración.
FENOBARBITAL	LUMINAL® comp, LUMINALETAS® comp	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	
FITOMENADIONA	KONAKION® Amp/Vial	Ambas	Diluir en 5 ml de agua	SI	Fotosensible, preparar justo antes de administrar.
FLECAINIDA	FLECAINIDA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15 - 20 ml de agua	NO	El inyectable puede administrarse por via OR, sin diluir.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
FLUCONAZOL (P)	FLUCONAZOL® caps EFG	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua		Riesgo proceso reproductivo. Seguir normas de precaución. Preferentemente usar la solución OR.
	DIFLUCAN® Sol OR	Ambas	La sonda puede obstruirse, se recomienda diluir en 100 ml de agua	SI	
FLUOXETINA	FLUOXETINA® comp dispersables EFG	Ambas	Dispersar en 20 ml de agua	SI	
	FLUOXETINA® caps EFG	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	
	FLUOXETINA® Sol OR EFG	Ambas	Diluir en 100 ml de agua	SI	
FÓLICO ÁCIDO	ACFOL® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Elevada inestabilidad, administrar inmediatamente.
FOLINATO CÁLCICO	LEDERFOLIN® comp	Ambas	Desleir en 15 - 20 ml de agua	SI	Elevada inestabilidad, administrar inmediatamente.
FOSFOMICINA	FOSFOCINA® caps	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	Aunque es compatible con la NE, se recomienda administrar 1h antes o 2 h después de ésta.
	FOSFOCINA® sol OR	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Aunque es compatible con la NE, se recomienda administrar 1h antes o 2 h después de ésta.
	FOSFOMICINA® EFG sobres	Ambas	Disolver en 20 ml agua y administrar inmediatamente	SI	Aunque es compatible con la NE, se recomienda administrar 1h antes o 2 h después de ésta.
FUROSEMIDA	FUROSEMIDA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Administrar en ayunas. Para la VPP, valorar la administración OR de la ampolla de SEGURIL®

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
GABAPENTINA	GABAPENTINA® caps EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
GEMFIBROZILO	GEMFIBROZILO®	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
GLIBENCLAMIDA	GLUCOLON® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
HALOPERIDOL	HALOPERIDOL® EFG comp	Ambas. De elección en VPP	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	HALOPERIDOL® gotas OR	VG	Diluir en 10 ml de agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE. Evitar en VPP, puede precipitar debido a su bajo pH.
HIDRALAZINA	HYDRAPRES® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar a1h antes de la NE.
HIDROCLOROTIAZIDA	HIDROCLOROTIAZIDA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal y aumenta la biodisponibilidad.
HIDROCORTISONA	HIDROALTESONA® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
HIDROXICARBAMIDA (P)	HYDREA® capsulas	Ambas	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua	SI	Se recomienda valorar la utilización de una FM.
	SYKLOS® comp recubiertos	Ambas	Disolver inmediatamente antes de su uso en una cucharilla	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Se recomienda valorar la utilización de una FM.
HIDROXIZINA	HIDROXIZINA QUIALIGEN® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
IBUPROFENO	IBUPROFENO® comp recubiertos EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
	IBUPROFENO® sol OR	Ambas	Diluir en 100 ml de agua	SI	Elevada osmolaridad y viscosidad.
ISONIAZIDA / PIRIDOXINA	CEMIDON® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
ITRACONAZOL	ITRACONAZOL® EFG caps	VG	Abrir y dispersar en 10 - 20 ml de agua. No triturar los microgránulos.	SI	Administrar inmediatamente después de la NE. Separar de antiácidos al menos 2h. Riesgo de obstrucción de la sonda si es fina.
IVABRADINA	IVABRADINA® EFG comp	VG	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
LABETALOL	LABETALOL® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
LACOSAMIDA	VIMPAT® sol	Ambas	Diluir 20 ml agua	SI	
	VIMPAT® comp		Desleir en 15-20 ml agua		
LACTULOSA	DUPHALAC® sol	Ambas	VG: Diluir en 15 ml agua VPP: Diluir en 100 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
LAMOTRIGINA	LAMOTRIGINA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Alternativa: comprimidos dispersables
LEVETIRACETAM	LEVETIRACETAM® sol OR	VG	Sin diluir	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
	LEVETIRACETAM® comprec	VPP	Desleir en 15-20 ml agua		
LEVODOPA/CARBIDOPA	SINEMET® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1 h antes o 2 h después de la NE. Alternativa a formas retard y ajuste posológico
LEVOFLOXACINO	LEVOFLOXACINO® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
LEVOMEPRMAZINA	SINOGAN® comprec	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Se recomienda utilizar la alterativa, gotas OR.
	SINOGAN® gotas OR	Ambas	Diluir en 10 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	SINOGAN® amp	Ambas	Diluir en 10 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
LEVOTIROXINA	LEVOTIROXINA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
LINEZOLID	LINEZOLID® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
	ZYVOXID® sol OR	Ambas	Diluir en 10 ml agua	SI	
LOPERAMIDA	LOPERAMIDA® caps	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml agua	SI	
LORAZEPAM	LORAZEPAM® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
LORMETAZEPAM	LORMETAZEPAM® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
LOSARTAN	LOSARTAN® comprec EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
MAGNESIO	MAGNESIOBOI® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
	MAGNESIO NM® sobres	Ambas	Diluir en 10 - 20 ml agua	SI	
MEMANTINA	MEMANTINA® comp recubiertos EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
METADONA	METADONA S.A.S	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
MERCAPTOPURINA (P)	XALUPRINE® susp OR	VG	Diluir presentación líquida en 15-20 ml agua	NO	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución Administrar 1 h antes ò 2 h después de la NE
	MERCAPTOPURINA® comp				Alternativa presentación líquida o FM
METAMIZOL	METAMIZOL® caps	VG	Abrir y diluir en 20 ml agua	SI	Ajustar posología según vía de administración y presentación de elección
	METAMIZOL® iny	VPP	Diluir en 20 ml agua		
METFORMINA	METFORMINA® comp recubiertos EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
METILDOPA	ALDOMET® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
METOCLOPRAMIDA	PRIMPERAM® sol OR	VG de elección	Diluir 10-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	PRIMPERAM® comp				
METRONIDAZOL	FLAGYL® susp OR	Ambas	VG: Sin diluir VPP: Diluir 20 ml agua	SI	Utilizar de elección la susp OR
	FLAGYL® comp		Desleir en 15-20 ml agua		
MIANSERINA	LANTANON® comprec	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
MICOFENOLATO MOFETILO (P)	CELLCEPT® susp OR	Ambas	Sin diluir o diluido en 50 ml agua		Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución Administrar 1 h antes ó 2 h después de la NE
	MICOFENOLATO MOF® cáps		Abrir, dispersar en en G5%	NO	
	MICOFENOLATO MOF® comp	NO			Sustituir por cápsulas o susp OR
MIDAZOLAM	DORMICUM® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	
	MIDAZOLAM® vial EFG	VPP de elección	Diluir en 5-10 ml de agua	NO	
MIRTAZAPINA	MIRTAZAPINA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Alternativa: compbuco dispersable
MISOPROSTOL	CYTOTEC® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
MORFINA	SEVREDOL® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Alternativa sol OR, diluido 10 ml agua Administrar 1 hora antes ó 2 h después NE
MOXIFLOXACINO	MOXIFLOXACINO® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
NIMODIPINO	NIMODIPINO® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
NITROFURANTOINA	FURANTOINA® comp	VG	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Alternativa: Furantoína sol OR Administrar 1 h antes o 2 h después de la NE
NORFLOXACINO	NORFLOXACINO® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	
OLANZAPINA	OLANZAPINA FLAS® compbucodispersables EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	De elección.
	OLANZAPINA® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Desleir en 15-20 ml agua	SI	
OMEPRAZOL	OMEPRAZOL® capsgastrorresistentes EFG	Ambas	VG: No triturar. Abrir , dispersar gránulos en medio vaso de agua ó G 5%. VPP: Triturar gránulos y dispersar en 10 ml Bicarbonato sódico 1 M	SI	Puede obstruir sonda Alternativa: Omeprazol susp ORFM. Alternativa: otros IBPs en compbucodispersables
ONDANSETRON	ONDANSETRON® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Sustituir por compbucodispersables
OXIBUTININA	DITROPAN® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
PARACETAMOL	PARACETAMOL® sol OR	Ambas	Diluir 30 ml agua	SI	
	PARACETAMOL® comp				Sustituir por sol OR
PAROXETINA (P)	PAROXETINA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Riesgo proceso reproductivo. Seguir normas de precaución. Alternativa Paroxetina gotas OR previamente diluida
PIRAZINAMIDA	PIRAZINAMIDA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua		
PIRIDOSTIGMINA	MESTINON® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
PIRIDOXINA	BENADON® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
POLIESTIRENSULFONATO CÁLCICO	RESINCALCIO® polvo para susp OR	Ambas	Diluir en 100 ml de agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
POTASIO	POTASION® Cap	Ambas	Abrir y diluir en 10 ml de agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
PRASUGREL	EFIENT® comprec	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	
PRAVASTATINA	PRAVASTATINA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
PREDNISONA	PREDNISONA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Valorar sustituir por Prednisolona sol OR con ajuste posológico
PREGABALINA	PREGABALINA® caps EFG	Ambas	Abrir y Diluir 20 ml agua	SI	Alternativa Pregabalina sol OR

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
PRIMIDONA	MYSOLINE® comp	VG	Desleir en 15-20 ml agua	NO	
PROCARBAZINA (P)	NATULAN® caps	Ambas	Abrir y Diluir 20 ml agua	NO	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución
PROPRANOLOL	PROPRANOLOL® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Alternativa Propranololsusp OR FM
QUETIAPINA	QUETIAPINA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
RIFAMPICINA	RIFALDIN® susp	Ambas	Diluir 10-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
	RIFALDIN® caps		Abrir y Diluir 20 ml agua		
	RIFALDIN® comp		Desleir en 15-20 ml agua		
RIFAXIMINA	SPIRAXIN® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
RILUZOL	RILUTEK® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
RIVAROXABAN	XARELTO® comprec	VG	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.
SERTRALINA	SERTRALINA® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Alternativa: Besitran gotas
SEVELAMER	RENAGEL® comprec	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
	RENVELA® sol OR	Ambas	Disolver en 30 ml de agua	SI	
SIMVASTATINA	SIMVASTATINA® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	
SULFADIAZINA	SULFADIAZINA® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	
SULFAMETOXAZOL/ TRIMETOPRIMA (COTRIMOXAZOL)	SEPTRIM PED® susp	Ambas	Diluir con 100 ml agua	NO	De elección, administrar VPP Administrar 1 h antes ó 2 h después de la NE
	SEPTRIM® comp		Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua		
SULFASALAZINA	SALAZOPYRINA® comp	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	
SULPIRIDA	SULPIRIDA® caps EFG	Ambas	Abrir y Diluir 20 ml agua	NO	Administrar 1 hora antes ó 2 h después de la NE
TACROLIMUS (P)	MODIGRAF® sol OR	Ambas	Diluir en 10 ml agua	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución
	PROGRAF® caps				Sustituir por presentación líquida Formas retardadas deben sustituirse por solución con ajuste posológico
TAMOXIFENO (P)	TAMOXIFENO® comp EFG	NO		SI	
TIAMINA	BENERVA® comp con película	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	Alternativa Benervainyó Tiamina 25 mg/ml FM

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
TIAPRIDA	TIAPRIZAL® gotas	Ambas	Sin diluir	SI	
	TIAPRIZAL® amp		Diluir 20 ml agua	SI	
	TIAPRIZAL® comp				Preferiblemente sustituir por gotas o iny
TIOGUANINA (P)	TIOGUANINA® comp	Ambas	Dispensar	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución
TOCOFEROL	AUXINA E® cap blanda	Ambas	La extracción del líquido con una jeringa puede producir pérdida del principio activo.	SI	Valorar sustitución por la ampolla, por vía IM.
TOLVAPTAN	TOLVAPTAN® comp EFG	VG	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	Se desconoce la absorción por VPP. Administrar preferentemente con la NE, por la mañana.
TOPIRAMATO (P)	TOPAMAX® comp	Ambas	Desleir (aprox 10 min)	SI	Riesgo proceso reproductivo. Seguir normas precaución. Riesgo obstrucción sonda
TRAMADOL	TRAMADOL® comp EFG	Ambas	Abrir y Diluir 20 ml agua	SI	
TRANEXAMICO ÁCIDO	AMCHAFIBRIN® iny	Ambas	VG: sin diluir VPP: Diluir 20 ml agua	SI	
	AMCHAFIBRIN® comp	NO		NO	Sustituir por inyectable ajustando posología
TRAZODONA	DEPRAX® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
TRIFLUSAL	DISGREN® caps	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml agua	SI	
URSODESOXICÓLICO ÁCIDO	ADISOCOL® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	El principio activo es fotosensible, administrar inmediatamente después de preparar.
	URSOBILANE® caps	Ambas	Abrir y diluir en 20 ml agua	SI	El principio activo es fotosensible, administrar inmediatamente después de preparar.
VALGANCICLOVIR (P)	VALCYTE® jarabe	Ambas	Diluir en 10 ml agua	SI	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución
	VALCYTE® comp	NO		NO	Sustituir por jarabe ajustando posología
VALPROICO ÁCIDO (P)	DEPAKINE® jarabe	Ambas	VG: Diluir 20 ml agua VPP: Diluir 80 ml agua	SI	Riesgo proceso reproductivo. Seguir normas precaución
	DEPAKINE® comp	NO		NO	Sustituir por jarabe ajustando posología
VENLAFAXINA	VENLAFAXINA® comp EFG	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	Es la alternativa a la Venlafaxina lib modificadas ajustando posología
VERAPAMILO	MANIDON® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	SI	
VORICONAZOL (P)	VORICONAZOL® comp EFG	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	NO	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Sustituir preferentemente por la suspensión OR, ajustando posología.
	VFEND® susp OR	Ambas	Diluir en 20 ml de agua y administrar	NO	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución

Principio Activo	Nombre Comercial	Vía de administración: Gástrica / Post pilórica	Recomendaciones	Compatibilidad con NE	Observaciones/Alternativas
WARFARINA (P)	ALDOCUMAR® comp	Ambas	Desleir en 15-20 ml agua	NO	Medicamento peligroso. Seguir normas de precaución. Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
ZOLPIDEM	ZOLPIDEM® comp EFG	Ambas	Desleir 10-20 ml agua	NO	Administrar 1h antes o 2 h después de la NE.
ZONISAMIDA (P)	ZONEGRAN® caps	Ambas	Abrir y dispersar en 20 ml agua	SI	Riesgo proceso reproductivo. Seguir normas precaución. Preferiblemente no manipular la cápsula. Utilizar la FM.
ZUCLOPENTIXOL	CLOPIXOL® comprec	Ambas	Triturar hasta polvo homogéneo y Diluir en 15-20 ml agua	SI	

SIGLAS: VG: gástrico, VPP: post-pilórico, P: Peligroso, FM: Fórmula Magistral, NE: Nutrición Enteral, OR: oral, G5%: suero glucosado 5%